



Magen-Tabletten

Wirkstoff: 500 mg Magnesiumtrisilikat
Bei Sodbrennen und Übersäuerung des Magens

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Magen-Tabletten jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Wofür werden Magen-Tabletten angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Magen-Tabletten beachten?
3. Wie sind Magen-Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Magen-Tabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WOFÜR WERDEN MAGEN-TABLETTEN ANGEWENDET?

Anwendungsgebiete: Bei Übersäuerung des Magens (Hyperazidität); Magendruck und Völlegefühl; Sodbrennen und saures Aufstoßen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON MAGEN-TABLETTEN BEACHTEN?

Magen-Tabletten dürfen nicht eingenommen werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Magnesiumtrisilikat oder einen der sonstigen Bestandteile von Magen-Tabletten sind
- bei eingeschränkter Nierenfunktion in höheren Dosen über längere Zeit ohne regelmäßige Kontrolle des Serum-Magnesium-Spiegels.

Bei Einnahme von Magen-Tabletten mit anderen Arzneimitteln:

Die gleichzeitige Einnahme von Magen-Tabletten mit anderen Arzneimitteln (z. B. Tetracycline, Herzglykoside, Atropin, Cimetidin, Barbiturate, Eisen) sollte vermieden werden, da die Resorption der mitverabreichten Arzneimittel beeinflusst werden kann. Deswegen sollte die Einnahme anderer Arzneimittel eine Stunde vor oder nach Einnahme der Magen-Tabletten erfolgen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor Kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Magen-Tabletten:

Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol. Bitte nehmen Sie Magen-Tabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE SIND MAGEN-TABLETTEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Magen-Tabletten immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: 3-4 x täglich 1-2 Tabletten einnehmen.

Art der Anwendung: Zum Lutschen oder Kauen.





Die Tabletten nach oder zwischen den Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen lutschen oder zerkaut einnehmen.

Dauer der Anwendung:

Magen-Tabletten sollen ohne ärztliche Anweisung nicht länger als eine Woche angewendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Magen-Tabletten zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können Magen-Tabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Bei Einnahme von hohen Dosen kann sich eine milde abführende Wirkung einstellen, in seltenen Fällen können sich Trisilikat-Nierensteine bilden.

Meldungen von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND MAGEN-TABLETTE AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Trocken, vor Licht geschützt und nicht über 25 °C aufbewahren.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Magen-Tabletten enthalten:

Der Wirkstoff ist:

1 Tablette enthält: Magnesiumtrisilikat 500 mg.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Sorbitol (Ph. Eur.), Vorverkleisterte Maisstärke, Pfefferminzaroma, Magnesiumstearat (Ph. Eur.).

Erhältliche Packungsgröße: Magen-Tabletten sind in Packungen mit 100 Lutsch-/Kautabletten erhältlich.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im August 2015.

Eti0815

Art-Nr.: 85

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.